

Beloeil, H., Viel, É., Navez, M.-L., Fletcher, D., and Peronnet, D. (2013). Recommandations formalisées d'experts SFAR-SFETD. Techniques analgésiques locorégionales et douleur chroniqueGuidelines for regional anesthetic and analgesic techniques in the treatment of chronic pain syndromes. Douleur Analgésie 26, 110–120.

van den Beuken-van, M.H., Hochstenbach, L.M., Joosten, E.A., Tjan-Heijnen, V.C., and Janssen, D.J. (2016). Update on prevalence of pain in patients with cancer: systematic review and meta-analysis. J. Pain Symptom Manage. 51, 1070–1090.

Deer, T.R., Pope, J.E., Hayek, S.M., Bux, A., Buchser, E., Eldabe, S., De Andrés, J.A., Erdek, M., Patin, D., Grider, J.S., et al. (2017). The Polyanalgesic Consensus Conference (PACC): Recommendations on Intrathecal Drug Infusion Systems Best Practices and Guidelines. Neuromodulation Technol. Neural Interface 20, 96–132.

Welsch, C., Delorme, T., Larue, F., Beauchet, A., Krakowski, I., and Brasseur, L. (2013). Données épidémiologiques sur la douleur du cancer en France. Évolution sur deux décennies de la prévalence et de l'intensité de la douleur chez les malades atteints de cancer. Douleur Analgésie 26, 126–132.